

Vaccination og Fertilitetsbehandling

Råd og vejledning

1. Hverken mænd eller kvinder behøver vente med fertilitetsbehandling, efter at de har fået vaccinen.
2. Gravide kvinder med Covid-19 er i højere risiko for et alvorligere sygdomsforløb end ikke gravide.
3. For nuværende er vejledningen i Danmark, at gravide ikke bør tilbydes Covid-19 vaccination. Der foreligger ingen dokumentation for, at vaccination skulle være skadelig for gravide, men der er behov for yderligere forskning på området.
4. Hvis en kvinde bliver gravid mellem første og anden vaccination, er anbefalingen at vente med andet stik, til efter graviditeten er afsluttet.
5. I Danmark er ingen af de anvendte vacciner for nuværende undersøgt eller godkendt til ammende kvinder, og risikoen for barnet er ukendt. Hvis en kvinde er i risikogruppe, kan hun i samråd med egen læge afveje fordele og ulemper ved vaccination.
6. Skulle kvinden vise sig at være gravid (på et tidligt stadie) på vaccinationstidspunktet, er der, på nuværende tidspunkt, ingen indikation for, at hun bør afslutte graviditeten.
7. Vaccinen kan gives på et hvilket som helst tidspunkt under behandlingen. Da nogle oplever at blive dårlige af vaccinen i et par dage efter, vil nogle patienter måske foretrække at undgå vaccination omkring ægudtagning, tilbagelægning eller sædproduktion. Der er dog ingen indikation for, at vaccinen påvirker succesraten i forbindelse med fertilitetsbehandling.
8. Patienter skal vente 28 dage med behandling efter en overstået Covid-19 infektion.

Baseret på anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, DSOG, HFEA and SSI:
<https://covid19.ssi.dk/vaccination/sporgsmaal-og-svar>

Opdateret 02-06-2021